# IMPFKALENDER

Sprache: **Deutsch**

**Die Impfungen sollten zum frühestmöglichen Zeitpunkt erfolgen.**
Die Überprüfung des Impfstatus ist in jedem Lebensalter sinnvoll.
Fehlende Impfungen sollten sofort, entsprechend den Empfehlungen für das jeweilige Lebensalter, nachgeholt werden.

Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO), 2018/19.
www.stiko.de

ROBERT KOCH INSTITUT

| IMPFUNG \ ALTER | (in Wochen) 6 | Säuglinge (in Monaten) 2 | 3 (U4) | 4 | Kleinkinder 11–14 (U6) | 15–23 (U7) | Kinder (in Jahren) 2–4 (U7A/8) | 5–6 (U9) | 7–8 (U10) | Jugendliche 9–14 (J1) | 15–16 | 17 | Erwachsene ab 18 | ab 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tetanus** | | G1 | G2 | G3 | G4 | N | | A1 | N | A2 | | N | A (f) (alle 10 Jahre, ggf. N) | |
| **Diphtherie** | | G1 | G2 | G3 | G4 | N | | A1 | N | A2 | | N | A (f) (alle 10 Jahre, ggf. N) | |
| **Keuchhusten** Pertussis | | G1 | G2 | G3 | G4 | N | | A1 | N | A2 | | N | A (f) (ggf. N) | |
| **Kinderlähmung** Poliomyelitis | | G1 | G2 (a) | G3 | G4 | N | | | | A1 | | N | ggf. N | |
| **Hepatitis B** | | G1 | G2 (a) | G3 | G4 | N | | | | | | | | |
| **Hib** *Haemophilus influenzae Typ b* | | G1 | G2 (a) | G3 | G4 | N | | | | | | | | |
| **Pneumokokken** (g) | | G1 | | G2 | G3 | N | | | | | | | S (c) | |
| **Rotaviren** | G1 (b) | G2 | (G3) | | | | | | | | | | | |
| **Meningokokken** Serogruppe C | | | | | G1 (ab 12 Monaten) | | N | | | | | | | |
| **Masern** | | | | | G1 | G2 | N | | | | | | S (d) | |
| **Mumps Röteln** | | | | | G1 | G2 | N | | | | | | | |
| **Windpocken** Varizellen | | | | | G1 | G2 | N | | | | | | | |
| **Grippe** Influenza | | | | | | | | | | | | | S (jährlich) | |
| **HPV** Humane Papillomviren | | | | | | | | | | G1 (e) | G2 (e) | N (e) | | |

## Nächste Impftermine

Gefördert durch:
Bundesministerium für Gesundheit
aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

## ERLÄUTERUNGEN

- **G** **GRUNDIMMUNISIERUNG** (in bis zu 4 Teilimpfungen G1–G4)
- **S** **STANDARDIMPFUNG**
- **A** **AUFFRISCHIMPFUNG**
- **N** **NACHHOLIMPFUNG** (Grundimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. Komplettierung einer unvollständigen Impfserie)

U **Früherkennungsuntersuchung**
J **Jugenduntersuchung** (J1 im Alter von 12–14 Jahren)

(a) Bei Anwendung eines monovalenten Impfstoffes kann diese Dosis entfallen.
(b) Die 1. Impfung sollte bereits ab dem Alter von 6 Wochen erfolgen, je nach verwendetem Impfstoff sind 2 bzw. 3 Dosen im Abstand von mindestens 4 Wochen erforderlich.
(c) Impfung mit Polysaccharid-Impfstoff, Auffrischimpfung nur für bestimmte Indikationen empfohlen.
(d) Einmalige Impfung für alle nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit. Vorzugsweise mit einem MMR-Impfstoff.
(e) Standardimpfung für Mädchen und Jungen im Alter von 9 bis 14 Jahren. Für Nachholimpfungen und Anzahl der Impfstoffdosen Fachinformation beachten.
(f) Td-Auffrischimpfung alle 10 Jahre. Die nächste fällige Td-Impfung einmalig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung.
(g) Frühgeborene erhalten eine zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d. h. insgesamt 4 Dosen.